



GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta

Sodio alginato + Sodio bicarbonato

Legga attentamente questo foglio poiché contiene importanti informazioni per lei.

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usarlo in modo accurato per ottenerne i migliori risultati.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se i suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo un breve periodo di trattamento, deve contattare il medico.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Gaviscon e a che cosa serve
2. Prima di prendere Gaviscon
3. Come prendere Gaviscon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon
6. Altre informazioni

1. CHE COSA E' GAVISCON E A COSA SERVE

Gaviscon è un medicinale che appartiene alla classe dei farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo.

Gaviscon si usa per il trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale.

2. PRIMA DI PRENDERE GAVISCON

Non usi Gaviscon

- Se è allergico (ipersensibile) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Gaviscon, compresi gli esteri degli idrossibenzoati (parabeni).
- Grave insufficienza renale.

Quando Gaviscon può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Non usare per trattamenti protratti. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Nei bambini usare solo in caso di effettiva necessità e sotto stretto controllo del medico. Nei bambini affetti da infiammazione gastrica e dell'intestino tenue o da insufficienza renale, Gaviscon aumenta il rischio di un eccesso dei livelli ematici di sodio. Pertanto le dosi indicate non devono essere superate.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Faccia particolare attenzione con Gaviscon

Nei pazienti con livelli molto bassi di acido gastrico c'è una possibilità di efficacia inferiore.

Uso di Gaviscon con altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

E' consigliabile interporre un intervallo di almeno due ore tra l'assunzione di Gaviscon e quella di altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Usare nei casi di effettiva necessità e sotto il controllo diretto del medico. In gravidanza e allattamento Gaviscon può essere usato dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio. Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o si desideri pianificare una maternità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Gaviscon non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Gaviscon

Ogni compressa da 250 mg +133,5 mg contiene 61,5 mg (2,65 mmol) di sodio.

Ciò deve essere tenuto in considerazione nei casi in cui sia raccomandata una dieta particolarmente povera di sale, ad esempio in alcuni casi di insufficienza cardiaca congestizia e compromissione renale.

Ogni compressa da 250 mg +133,5 mg contiene 80 mg (0,8 mmoli) di calcio carbonato.

Si deve prestare attenzione nel trattare pazienti affetti da ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.

Le compresse contengono aspartame, una fonte di fenilalanina: non deve pertanto essere assunto da pazienti affetti da fenilchetonuria.

3. COME USARE GAVISCON

QUANTO

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 2-4 compresse dopo i pasti e al momento di coricarsi.

Attenzione: non superare le dosi indicate.



Popolazioni speciali

Anziani: non è necessario modificare le dosi per questa fascia d'età.
Pazienti con insufficienza renale: la ridotta capacità di eliminare con l'urina il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi (vedere "Avvertenze speciali").

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

COME

Le compresse devono essere ben masticate (possono essere spezzate e masticate un po' alla volta). Successivamente si può bere un po' d'acqua.

Se prende più Gaviscon di quanto deve

L'esperienza sul sovradosaggio è molto limitata. L'unica possibile conseguenza del sovradosaggio è la distensione addominale: in tal caso ricorrere al trattamento sintomatico adottando misure di supporto generiche.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Gaviscon avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI GAVISCON, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, anche Gaviscon può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raramente sono stati riportati casi di flatulenza, nausea e ritenzione idrica (edema).

Molto raramente pazienti sensibili ai componenti del prodotto possono sviluppare manifestazioni allergiche come orticaria e broncospasma, reazioni anafilattiche o anafilattoidi.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE GAVISCON

TENERE GAVISCON FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

Non usi Gaviscon dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Norme di conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 30°C.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Gaviscon

GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: **sodio alginato 250 mg**
sodio bicarbonato 133,5 mg

Eccipienti: mannitolo (E421); calcio carbonato; magnesio stearato; copovidone; aspartame (E951); **acesulfame** potassico (E950); macrogoli 20.000; aroma menta.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon e contenuto della confezione

Comprese masticabili 250 mg +133,5 mg: compresse masticabili dal sapore di menta, confezionate in blister. Il contenuto della confezione è di 16, 24, 32 o 48 compresse masticabili.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull (Regno Unito).

Rappresentante per l'Italia: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. – via Spadolini 7 – 20141 Milano.

PRODUTTORE

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull (Regno Unito).

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il 24 Gennaio 2011.